

آمپول ریسپردون تزریقی (ریسپردال کنستا)

شناسنامه بروشور

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| عنوان | آمپول ریسپردون تزریقی |
| تهیه کننده | آقای خوش اندام (کارشناس پرستاری) |
| نابود کننده | کمیته آموزش به بیمار |
| تاریخ بازنگری | تیرماه 1403 |
| ناظر کیفی | |
| دکتر مقیمی | معاون آموزشی |
| خانم مقصودی | سوپروایزور آموزشی |
| کدمدرک | EB-EP-7/3/37 |

مقدمه :

آمپول ریسپردون طولانی اثر یا ریسپردال کنستا در دوزهای 25، 37.5 و 50 میلی گرمی موجود است و جهت تسکین علائم اسکیزوفرنیا شامل توهم شنوایی، توهم بینایی، داشتن باورهای اشتباه و احساسات غیر عادی مشکوک و همچنین در راستای تعادل مواد شیمیایی مغز کار می کند. این دارو جهت نگهداری وضعیت علائم اسکیزوفرنیا که با داروی ریسپردون تسکین یافته است استفاده می شود. آمپول ریسپردون به صورت یک انبار دارویی ریسپردون عمل کرده و آرام آرام دارو را در بدن آزاد می کند.

موارد منع مصرف :

بارداری، شیردهی، در صورتی که تاریخ دارو گذشته باشد، هرگز به فردی یا علائم مشابه تجویز نکنید، ممکن است باعث سرگیجه و خواب آلودگی شود لذا قبل از انجام کارهایی که به هوشیاری نیاز دارد استفاده نشود.

هشدار و احتیاطات قبل از مصرف دارو:

پزشک را قبل از تجویز دارو از مشکلات زیر آگاه سازید:

- 1- اگر بیماری قلبی عروقی دارید.
- 2- اگر مشکل کلیه کبد و یا پروستات دارید .
- 3- اگر مشکل تنفسی دارید.
- 4- اگر مشکل صرع یا پارکینسون دارید.
- 5- اگر آب مروارید یا آب سیاه دارید و یا تحت عمل جراحی چشم قرار گرفته اید.
- 6- اگر فشارخون دارید.

تداخلات دارویی:

- 1- با داروی میتو کلوپرامید تداخل دارد.
- 2- با مصرف همزمان ضد اضطراب ها مثل آلپرازولام دیازپام، کلونازپام، زولپیدم باعث سرگیجه، خواب آلودگی می شود لذا هنگام رانندگی و کار با ماشین آلات از هوشیاری خود مطمئن باشید.

مصرف دارو در بارداری و شیردهی

دارو می تواند آثار مخربی روی جنین و مادر باردار داشته باشد و نباید در این دوران استفاده شود.



عوارض رایج ریسپردال کنستا:

- علائم سرما خوردگی،
- مشکلات خواب،
- حرکات آرام،
- سردرد،

-سرگیجه، خواب آلودگی،

-سوء هاضمه، دل درد، تهوع، خشکی دهان،

-تنگی نفس، تغییر ضربان قلب ، تغییر در فشار خون،

-تغییر در وزن و مشکلات قاندهی.

مسمومیت با دارو :

در صورت علائم زیر با اورژانس تماس بگیرید .

تشنج ، سرگیجه شدید، غش و ضعف حرکات غیر معمول و غیر قابل کنترل، ضربان قلب سریع ، تنگی نفس ، افت سطح هشیاری .

نکات قابل توجه :

1-دارو طبق دستور پزشک استفاده شود ولی معمولا هر 2 هفته یکبار بصورت عضلانی استفاده می شود .

2-اگر شما تجربه علائمی مانند سفتی عضلات تب بسیار بالا ، احساس گیجی، ضربان قلب سریع و تعرق داشتید حتما به صورت اورژانسی به پزشک مراجعه کنید این علائم می تواند نشانه یک بیماری نادر به نام سندرم نورولپتیک بدخیم باشد.

3-ریسپریدون تزریقی را بیش از دارویی که پزشک تجویز کرده است استفاده نکنید .

4-مصرف الکل ، مارجوانا ، مصرف داروهای خواب آور و ضد اضطراب می تواند عوارض جانبی این دارو را چند برابر کند . لذا پزشک خود را از مصرف تمامی دارو ها مطلع کنید و به صورت خود سرانه دارو مصرف نکنید .

منابع :

Med Scape.COM

Web Md.COM

Drugs.COM

| | |
|---|--------------------------|
|  | نوبت دهی اینترنتی |
|  | آموزش به بیمار و مراجعین |

مراجعین گرامی: برای دسترسی به اطلاعات، از طریق نصب نرم افزار بارکد خوان بر روی گوشی همراه خود، اقدام به اسکن بارکد درج شده در فرم نمایید.

آدرس : شیراز - چهار راه حافظیه - خیابان حافظ - جنب بوستان

سیزده آبان- بیمارستان ابن سینا

تلفن گویا : 4- 07132289601

سایت : <http://ebnesina.sums.ac.ir>