

کوئتیاپین

شناسنامه بروشور

عنوان	کوئتیاپین
تهیه کننده	سعیدرضا خوش اندام
تأیید کننده	کمیته آموزش به بیمار
تاریخ بازنگری	تیرماه 1403
ناظر کیفی	
دکتر مقیمی	معاون آموزشی
خانم مقصودی	سوپروایزور آموزشی
کدمدرک	EB-EP-7/3/44

مقدمه:

قرص کوئتیاپین یا ترانکوپین برای کنترل و درمان بیماری های خلقی، ناراحتی های اعصاب مثل اسکیزوفرنی و دو قطبی، (مانیا یا افسردگی) کاربرد دارد. این دارو باعث نظم بخشیدن به مواد شیمیایی خاصی در مغز می گردد. بیمار با مصرف دارو حس بهتری را تجربه نموده و تا حدی نسبت به شرایط محیط کمتر واکنش های نا مناسب نشان میدهد. کوئتیاپین همچنین مشکلات خواب و اشتها را بهبود می بخشد.

موارد منع مصرف:

- به تاریخ انقضای دارو توجه کرده و در صورت گذشتن از زمان از تاریخ مذکور از مصرف آن خودداری شود.
- اگر چند دارو استفاده می کنید حتما با پزشک خود در مورد تداخل دارویی مشورت کنید.
- از مصرف الکل و آب گریپ فروت به همراه داروی کوئتیاپین اجتناب کنید، زیرا میزان دارو را در خون افزایش داده و عوارض جانبی آن را بدتر می کند.
- در دوران بارداری و شیردهی نباید دارو به شکل خودسرانه و بدون مشورت پزشک استفاده شود. علت این امر آن است که دارو می تواند آثار مخربی روی جنین داشته باشد.

عوارض جانبی دارو:

یبوست، گیجی یا افزایش وزن، تاری دید، خشکی دهان، فشار خون، تاکی کاردی، چربی خون، قند خون، کم کاری تیروئید، تهوع و خواب آلودگی از جمله عوارض این دارو به شمار می-روند.



موارد مصرف دارویی:

موارد مصرف این دارو به شرح زیر هستند. با این حال دستور مصرف دارو باید به وسیله پزشک معالج داده شود:
- درمان کمکی با لیتیوم یا سدیم والپروات برای درمان کوتاه مدت حملات مانیک حاد در اختلال دو قطبی.
- در افسردگی اساسی در کنار سایر دارو های ضد افسردگی موثر است .
- باعث کاهش بی قراری در افراد مبتلا به سرخوشی در سوء مصرف مواد می شود.
- در مصرف مقدار کم دارو، در بهبود عملکرد خواب موثر است.
- در اختلالات اضطرابی درمان کمک کننده در کنار سایر دارو ها می باشد.

مصرف دارو در سالمندان:

ترانکوپین در افراد مسن مبتلا به روانپریشی مرتبط با زوال عقلی استفاده می شود . اما خطر سکتة مغزی و مرگ ناشی از نارسایی قلبی یا عفونت های مانند ذات الریه را ممکن است افزایش دهد. از این رو سالمندان تنها در صورت عدم وجود بیماری های دیگر، می تواند قرص ترانکوپین را مصرف کنند.

موارد احتیاط:

اگر هرگونه علائم احتمالی شامل سفتی عضلات، تب، پریشانی، تعرق، تغییر در ضربان و سرعت تپش قلب و فشار خون، در شما بروز کرد ممکن است علائم یک عارضه بسیار نادر ولی خطرناک باشد. لذا مصرف دارو را قطع کرده و فوراً به پزشک خود یا بیمارستان مراجعه نمایید.

قرص کوئتیاپین جهت کمک به خواب در افرادی که مشکل اعصاب و روان ندارند توصیه نمی شود.

جهت درمان بی خوابی داروهایی با عوارض کمتر تجویز می شود، لذا دارو در درمان بی خوابی و علائم همراه آن در بیماران دو قطبی و اسکیزوفرنیا استفاده می شود.

دوز رایج دارو در بازار 25، 50، 100، 150، 200، 300 میلی گرم می باشد.



توصیه دارویی :

1- طبق تجویز شب مصرف کنید و اگر در دوز روز نیز تجویز شده است طبق دستوردر یک ساعت معین استفاده شود.

2- این دارو می تواند اثر داروهای ضد فشارخون را کم کند.

3- معمولاً یک تا دو هفته زمان لازم است تا اثرات دارویی روی بیمار تاثیر کند.

منابع:

Med Scape.CO
Web Md.COM
Drugs.COM

نوبت دهی اینترنتی



آموزش به بیمار و مراجعین



مراجعین گرامی: برای دسترسی به اطلاعات، از طریق نصب نرم افزار بارکد خوان بر روی گوشی همراه خود، اقدام به اسکن بارکد درج شده در فرم نمایید.

آدرس: شیراز - چهار راه حافظیه - خیابان حافظ - جنب بوستان

سیزده آبان - بیمارستان ابن سینا

تلفن گویا: 4-07132289601

سایت: <http://ebnesina.sums.ac.ir>