



باسمه تعالی



بوپرنوفین:

تهیه کننده: مهرداد سعیدی

زیر نظر سوپروایزر آموزش آموزش سلامت

مرکز آموزشی درمانی ابن سینا

آدرس: شیراز - چهار راه حافظیه - خیابان حافظ - جنب بوستان

سیزده آبان - بیمارستان ابن سینا

تلفن گویا: 4-07132289601

سایت: <http://ebnesina.sums.ac.ir/>

بوپرنوفین:

یک داروی مخدر با احتمال وابستگی شبیه سایر مخدر ها بوده و مسکن قوی و ضد درد به شمار می رود. مصرف این دارو به شکل "زیرزبانی" بوده و جهت ترک تریاک و مشتقات مورفین تنها در کوتاه مدت و زیر نظر پزشک متخصص جایز می باشد. مصرف طولانی مدت این دارو فقط برای بیمارانی که تحمل ترک ندارند توصیه می گردد. مصرف این دارو به شکل زیر زبانی می باشد.

بوپرنوفین جهت ترک مواد مخدر طبق شرایط بیمار به دو صورت توسط پزشک تجویز می شود.

1- سم زدایی:

در افرادی که قصد ترک کامل مواد مخدر دارند از این روش بهره برده می شود. با سم زدایی، بدن از مواد مخدر پاک شده و در صورت عدم استفاده بیمار دچار علائم ترک نمی شود.

2- درمان نگهدارنده (طولانی مدت)

بیماران زیادی هستند که بارها سم زدایی شده اند اما دوباره وسوسه به مصرف مواد پیدا کرده اند و یا به دلیل شرایط خاص خود تحمل ترک کامل مواد را ندارند. در این روش بعد از سم زدایی طبق نظر پزشک، بیمار با یک مقدار مشخص روزانه دارو را استفاده می کند و زیر نظر پزشک می تواند به مرور زمان دارو را کاهش دهد. هدف اصلی از مصرف این دارو کاهش وسوسه مصرف مواد در بیماران می باشد.

فواید مصرف بوپرنوفین در درمان نگهدارنده:

1- مصرف مواد مخدر قطع می شود و حتی در

صورت مصرف توسط بیمار، مواد مخدر جذب

بدن نشده و اثری روی بدن ندارد.

2- بوپرنوفین نئشگی ندارد و بیمار می تواند

کارهای روز مره خود را انجام دهد.

3- این دارو زندگی بیمار را ثبات می بخشد و بیمار

می تواند به شغل های مفید روی آورده و باعث



منابع :

شرکت داروسازی پورسینا، کتاب فارماکولوژی ایران فارما،
سایت paziresh.com

شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	بوپرنوفین
تهیه کننده	مهداد سعیدی
سمت	کارشناس پرستاری
تأیید کننده	کمیته آموزش به بیمار
تاریخ تهیه	خرداد 1401

اگر چه احتمال بروز همه ی این عوارض در فرد به شکل یک جا کم می باشد ، در صورت بروز عوارض با پزشک مشورت کنید.

عوارض شایع مصرف این دارو شامل سرگیجه، خواب آلودگی ، سردرد ، کاهش فشار خون ، تهوع، تعرق و یبوست است.

نکته:

مصرف زیاد و خود سرانه این دارو می تواند باعث مسمومیت گردد که از علائم آن میتوان به کاهش فشار خون ، شوک ، ایست قلبی ، ورم ریه ، تشنج و مرگ اشاره نمود.

دوز مصرفی دارو:

اشکال این دارو شامل قرص های 0.4 ، 2 ، 8 میلی گرمی می باشند که فقط به صورت زیر زبانی استفاده می شود.

بهبود تغذیه ، خواب و توان و انگیزه ورزش کردن در بیمار می شود.

4- این دارو مرگ و میر ناشی از مصرف مواد را کاهش میدهد.

5- از نظر هزینه، فشار مالی کمتری به خانواده تحمیل می کند و مقرون به صرفه تر از مصرف مواد می باشد.

نکات مهم:

این دارو هرگز نباید همزمان با مواد مخدر مثل هروئین ، متادون، شیره و استفاده شود.

حداقل باید 12 ساعت از مصرف آخرین دوز مواد مخدر گذشته باشد به نحوی که بیمار دچار علائم ترک شده باشد.

مصرف خودسرانه ی دارو ممنوع است.

عوارض جانبی :

هر دارو به موازات اثرات درمانی ممکن است باعث بروز بعضی عوارض ناخواسته نیز شود.