



باسمه تعالی



پرفنازین

تهیه کننده: سعید رضا خوش اندام

زیر نظر سوپروایزر آموزش ضمن خدمت

مرکز آموزشی درمانی ابن سینا

آدرس: شیراز - چهار راه حافظیه - خیابان حافظ - جنب بوستان

سیزده آبان - بیمارستان ابن سینا

تلفن گویا: 4-07132289601

سایت: <http://ebnesina.sums.ac.ir/>

مقدمه :

پرفنازین در اشکال خوراکی و تزریقی جهت درمان اسکیزوفرنیا و حالات روانی، مانیا و درمان کمکی کوتاه مدت اضطراب شدید، تحریکات روانی حرکتی - هیجان و تحریکات رفتاری شدید و ناگهانی، استفراغ و تهوع شدید به کار می رود. دوز خوراکی 2، 4 و 8 میلی گرم می باشد. فرم تزریقی آن به صورت محلول تزریقی و به شکل عضلانی عمیق جهت بیمارانی است که تمایل به مصرف داروی خوراکی ندارند یا قادر به بلع قرص پرفنازین نمی باشند. اکثر موارد تزریق 2/3 دوز خوراکی اصلی کافی اس. اما میزان دقیق فقط بر اساس صلاحدید پزشک است. لذا به محض بهبود اوضاع بیمار فرم خوراکی شروع می شود.

عوارض جانبی:

عوارض این دارو شامل موارد ذیل می تواند باشد:

افت یا افزایش فشار خون فگیجی، سردرد، تب، بی خوابی، لرزش بدن، ضعف عضلات، تشنج و بی قراری

افزایش تعرق، رنگ پریدگی، تغییر رنگ پوست (آبی خاکستری)، افزایش قند خون و افزایش و یبوست، تهوع، ترشح براق، خشکی دهان. با این حال تمامی این علائم بسیار به ندرت در یک بیمار بروز می نماید. ادرار زیاد و احتقان بینی.

موارد مصرف:

این دارو با تشخیص پزشک معالج برای موارد زیر قابل تجویز است: اسکیزوفرنیا، دوقطبی در حالت شیدایی، درمان اضطراب، تحریکات رفتاری شدید و ناگهانی، استفراغ و تهوع شدید.

موارد منع مصرف:

- بیماری های قلبی

- بیماران مبتلا به کمی یا افزایش فشار خون

- بیماران دچار سکته مغزی -کما و تشنج

موارد احتیاط در مصرف:

به دلیل ایجاد سرگیجه و خواب آلودگی ، قبل از فعالیت

های که به هوشیاری کامل نیاز دارند (رانندگی و کارهای

فنی) داروی پرفنازین را مصرف نکنید.

در صورت داشتن حساسیت دارویی و غذایی حتما به پزشک

خود اطلاع دهید .

-در صورت بروز موارد آلرژیک مثل خارش گلو ، یبوست

به پزشک مراجعه کنید .

این دارو ممکن است شما را به نور خورشید حساس کند.

بنابراین قرار گرفتن در مقابل نور خورشید و لامپ های

مهتابی حتی الامکان خودداری نمایید و از کرم های ضد

آفتاب و پوشش های محافظ صورت استفاده کنید.

-قبل از انجام عمل جراحی و دندان پزشکی مصرف دارو را

به پزشک اطلاع دهید.

-عوارض برای سالمندان شدید تر است و خطر سقوط را به

دلیل گیجی افزایش می دهد.

-این دارو در دوران بارداری با تجویز پزشک شروع شود و

در زمان شیردهی چون شیر مادر به نوزاد متصل می شود می

تواند اثرات نا مطلوبی روی نوزاد داشته باشد.

-در صورتی که یک نوبت مصرف دارو را فراموش کردید هر

موقع که به یاد آوردید آن دوز را مصرف نمائید. اما اگر زمان

این رسید که دوز جدید را مصرف کنید آن قرص فراموش

شده را کنار بگذارید و مطابق با برنامه قبلی خود دوز جدید

را مصرف کنید و میزان آنرا افزایش ندهید.

-اگر هرگونه علائم احتمالی شامل سفتی عضلات، تب ،

پریشانی ، تعریق ، تغییر در ضربان و سرعت تپش قلب و

فشار خون در شما بروز کرد ممکن است علائم این عارضه

خطر ناک باشد لذا مصرف دارو را قطع کرده و فوراً به پزشک

خود یا بیمارستان مراجعه شود.

منبع :

Med Scape.COM

Web Md.COM

Drugs.COM

شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	پرفنازین
تهیه کننده	سعید رضا خوش اندام
سمت	مسئول بخش ECT(کارشناس پرستاری)
تأیید کننده	کمیته آموزش به بیمار
تاریخ تهیه	خرداد 1401